

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2016年9月

皇漢堂製薬株式会社

緩下剤  
センノシド錠

センノシド錠 12mg「クニヒロ」

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。今後のご使用に際しましては、下記の点にご留意くださいますようお願い申し上げます。

### 【改訂内容】

改訂後（下線部：改訂箇所）	改訂前（該当箇所のみ）																																
<b>3. 副作用</b> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>過敏症<sup>注1)</sup></td><td>発疹等</td></tr><tr><td>代謝・栄養</td><td>低カリウム血症、低ナトリウム血症、脱水</td></tr><tr><td>心血管系</td><td>血圧低下</td></tr><tr><td>消化器</td><td>腹部不快感、<u>大腸メラノーシス<sup>注2)</sup></u>、腹痛、下痢、悪心・嘔吐、腹鳴</td></tr><tr><td>肝臓</td><td>ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、<math>\gamma</math>-GTP上昇、血中ビリルビン上昇</td></tr><tr><td>腎臓・泌尿器</td><td>腎障害、着色尿<sup>注3)</sup></td></tr><tr><td>全身症状</td><td>疲労</td></tr></tbody></table> <p>注1) 投与を中止し、適切な処置を行うこと。 注2) <u>長期連用により発現することがある。</u> 注3) <u>黄褐色又は赤色を呈することがある。</u></p>		頻度不明	過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹等	代謝・栄養	低カリウム血症、低ナトリウム血症、脱水	心血管系	血圧低下	消化器	腹部不快感、 <u>大腸メラノーシス<sup>注2)</sup></u> 、腹痛、下痢、悪心・嘔吐、腹鳴	肝臓	ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、血中ビリルビン上昇	腎臓・泌尿器	腎障害、着色尿 <sup>注3)</sup>	全身症状	疲労	<b>3. 副作用</b> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>過敏症<sup>注1)</sup></td><td>発疹等</td></tr><tr><td>代謝・栄養</td><td>低カリウム血症、低ナトリウム血症、脱水</td></tr><tr><td>心血管系</td><td>血圧低下</td></tr><tr><td>消化器</td><td>腹部不快感、腹痛、下痢、悪心・嘔吐、腹鳴</td></tr><tr><td>肝臓</td><td>ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、<math>\gamma</math>-GTP上昇、血中ビリルビン上昇</td></tr><tr><td>腎臓・泌尿器</td><td>腎障害、着色尿<sup>注2)</sup></td></tr><tr><td>全身症状</td><td>疲労</td></tr></tbody></table> <p>注1) 投与を中止し、適切な処置を行うこと。 注2) 黄褐色又は赤色を呈することがある。</p>		頻度不明	過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹等	代謝・栄養	低カリウム血症、低ナトリウム血症、脱水	心血管系	血圧低下	消化器	腹部不快感、腹痛、下痢、悪心・嘔吐、腹鳴	肝臓	ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、血中ビリルビン上昇	腎臓・泌尿器	腎障害、着色尿 <sup>注2)</sup>	全身症状	疲労
	頻度不明																																
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹等																																
代謝・栄養	低カリウム血症、低ナトリウム血症、脱水																																
心血管系	血圧低下																																
消化器	腹部不快感、 <u>大腸メラノーシス<sup>注2)</sup></u> 、腹痛、下痢、悪心・嘔吐、腹鳴																																
肝臓	ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、血中ビリルビン上昇																																
腎臓・泌尿器	腎障害、着色尿 <sup>注3)</sup>																																
全身症状	疲労																																
	頻度不明																																
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹等																																
代謝・栄養	低カリウム血症、低ナトリウム血症、脱水																																
心血管系	血圧低下																																
消化器	腹部不快感、腹痛、下痢、悪心・嘔吐、腹鳴																																
肝臓	ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、血中ビリルビン上昇																																
腎臓・泌尿器	腎障害、着色尿 <sup>注2)</sup>																																
全身症状	疲労																																

### 【改訂理由】

(      部分) 自主改訂による改訂

本改訂につきましてはDSU No. 253への掲載を予定しています。