

胃炎・潰瘍治療剤

薬価基準収載

アズレンスルホン酸ナトリウム・ L-グルタミン配合顆粒「クニヒロ」

Sodium Azulene Sulfonate・L-Glutamine Combination Granules 「KUNIHIRO」



効能効果、用法用量、使用上の注意等については、DI 欄をご参照下さい。

製造
販売元

皇漢堂製薬株式会社

医薬営業部

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

TEL : 06-6482-5115 FAX : 06-6482-7492

2010年5月作成（第1版）

アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン配合顆粒「クニヒロ」

Sodium Azulene Sulfonate・L-Glutamine Combination Granules 「KUNIHIRO」

Drug Information

組成・性状	
販売名	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン配合顆粒「クニヒロ」
成分・含量	1g 中にアズレンスルホン酸ナトリウム水和物(局外規) 3mg、L-グルタミン(日局) 990mg を含有する。
添加物	メチルセルロース、ヒプロメロース、炭酸水素ナトリウム
色調・性状	本品は青紫色の顆粒である。なお、分包品もある。
外形・サイズ	
識別コード	KSK222

日本標準商品分類番号	872329
承認番号	22200AMX00129000
承認年月	2010年1月
薬価収載	2010年5月
販売開始	2010年5月

使用期限

製造後3年

貯法

遮光密閉容器にて室温保存

包装

分包: 0.67g × 600包 (0.67g × 3 × 20 × 10 枚)

バラ: 500g

効能・効果

下記疾患における自覚症状及び他覚所見の改善
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎

用法・用量

通常成人1日1.5～2.0gを3～4回に分割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

使用上の注意

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

次のような副作用が認められた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹、蕁麻疹、そう痒感
肝臓	AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、AI-P、γ-GTP 上等の肝機能障害
消化器	悪心、嘔吐、便秘、下痢、腹痛、膨満感、嘔気、胃部不快感
その他	顔面紅潮

注) このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。

2. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

4. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない(使用経験がない)。

*詳細は添付文書等をご覧下さい。「使用上の注意」の改訂に十分ご留意下さい。