

ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。  
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

KN201106  
0723

第2類医薬品

便秘治療剤

# ビューラック・ソフト

0723

食生活の欧米化に伴い、便秘で悩んでいる方が増えています。ビューラック・ソフトは胃・小腸ではほとんど作用せず、大腸で活性化されて効果をあらわす刺激性下剤で、大腸の蠕動（ぜんどう）運動を促進し、おやすみ前に服用することにより、翌朝にはおだやかなお通じが期待できる便秘薬です。



## ⚠️[使用上の注意]

### してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
他の瀉下薬（下剤）
2. 大量に服用しないでください。

### 相談すること 🗣️

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3) 次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。  
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

(裏面もお読みください)

## [成分] 1日量(3錠)中

ピコスルファートナトリウム水和物……………7.5mg  
添加物として、乳糖水和物、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ヒプロメロース、白糖、タルク、酸化チタン、アラビアゴム、ポビドン、カルナウバロウ、ステアリン酸マグネシウム、赤色3号を含有します。

## [効能・効果]

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

## [用法・用量]

次の1回量を就寝前（または空腹時）に水またはお湯でかまずに服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2～3錠	1回
15歳未満の小児	服用しないこと	


### <用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出しお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

(PTPシートの取り出し図)



## [保管および取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。

(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

**皇漢堂製薬株式会社**

(20.5.改訂)